



### Research in Sport Medicine and Technology



Print ISSN: 2252 - 0708 Online ISSN: 2588 - 3925

Homepage: https://jsmt.khu.ac.ir

# The Effect Of Six Weeks Of Aerobic Activity On The Motor Fitness Of Inactive Young Girls

Maliheh Ardakanizadeh¹¹ݨ | Alireza Rahimi² | Leyla vesaliakbarpour³

- 1. Department of sport sciences, Faculty of human sciences, Damghan University, Semnan, Iran.
- 2. Faculty of Physical Education and Sport Science, Karaj Branch, Islamic Azad Úniversity, Karaj, Iran.
- 3. Ph.D of exercise physiology, Faculty of sport sciences, Bu-Ali Sina university, Hamadan, Iran.



corresponding author: Maliheh Ardakanizadeh, maliheh\_ardakani@yahoo.com

#### **ARTICLE INFO**

### Article type:

Research Article

#### Article history:

Received: 2024/01/11 Revised: 2024/02/19 Accepted: 2024/02/19

### Keywords:

Motor fitness, Water, Land

#### **How to Cite:**

Maliheh Ardakanizadeh, Alireza Rahimi, Leyla vesaliakbarpour. The Effect Of Six Weeks Of Aerobic Activity On The Motor Fitness Of Inactive Young Girls. Research In Sport Medicine and Technology, 2024: 22(28): 109-123. It seems that aerobic exercise in water is more effective in promoting motor fitness factors due to its greater resistance force compared to the dry environment. Accordingly, the aim of this study was to compare the effect of aerobic exercise in water and land on the physical fitness of inactive girls.

Thirty non-athletic girls were randomly divided into two groups water and Land (n=15), and performed aerobic activity for six weeks (3 sessions/week) with 60-70% of maximum heart rate. Before and after aerobic activity, was calculated their explosive power using the vertical jump (Sargent), agility (4×9test), reaction (reaction time test), and the balance (static balance test). For compare pre- and post-test, and to compare post-test results in water and land, One-way ANOVA (p≤0.05).

After aerobic activity (water and land) compared to before, significant improvement was found in the values of explosive power (p=0.001), agility (p=0.001) and static balance (p=0.003), while the comparison of training in water and land did not show a significant difference (p>0.05).

It seems that aerobic activity (water and land) can affect explosive power, agility and static balance, but no effect on reaction, also there is no difference between the two environments.



Published by Kharazmi University, Tehran, Iran. Copyright(c) The author(s) This is an open access article under e: CC BY-NC license (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)









شايا چاپي: ۲۲۰۸-۲۲۵۲ شايا الکترونيکي: ۳۹۲۰-۲۰۸۸ Homepage: https://jsmt.khu.ac.ir

### تأثير شش هفته فعاليت هوازي، بر عوامل آمادگي حركتي دختران جوان غيرفعال

مليحه اردكانيزاده الها عليرضا رحيمي الله وصالى اكبرپور الله وصالى اكبرپور الله

- ۱. استادیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه دامغان، دامغان، ایران.
- ۲. دانشیار گروه علوم ورزشی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرج، کرج، ایران.
  - ۳. دکترای فیزیولوژی ورزش، دانشکده علوم ورزشی، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران.

نویسنده مسئول: ملیحه اردکانیزاده maliheh\_ardakani@yahoo.com

### نوع مقاله: علمي-يژوهشي

در بافت: ۱٤٠٢/۱٠/۲۱ ويرايش: ١٤٠٢/١١/٣٠ پذیرش: ۱٤٠٢/۱۱/٣٠

اطلاعات مقاله:

### واژههای کلیدی:

آمادگی حرکتی، آب، خشکی

#### ارجاع:

مليحه اردكانيزاده، عليرضا رحيمي، ليلا وصالى اكبرپور. تأثير شش هفته فعاليت هوازی، بر عوامل آمادگی حرکتی دختران جوان غیرفعال. پژوهش در طب ورزشی و فناوری. ۱۲۳:(۲۸):۲۲ - ۱۰۹

### حكيده

## به نظر می رسد که تمرینات هوازی در آب به دلیل نیروی مقاومتی بیشتر در مقایسه با محیط خشكي، بر ارتقا عوامل آمادگي حركتي مؤثر تر باشد، بر همين اساس هدف از اين مطالعه مقايسه اثر تمرین هوازی در آب و خشکی بر آمادگی حرکتی دختران غیرفعال است.

۳۰ نفر دختر غیرورزشکار بهطور تصادفی به دو گروه ۱۵ نفری آب و خشکی تقسیم شدند، و به مدت شش هفته (۳جلسه در هفته) با ۷۰-۲۰درصد حداکثر ضربان قلب به فعالیت هوازی پرداختند. پیش و پس از اجرای فعالیت، توان انفجاری (پرش عمودی سارجنت)، چابکی (تست Ax3)، سرعت عكس العمل (دستگاه Reaction time)، و تعادل ایستا (دستگاه Xx balance) محاسبه گردید. جهت مقایسهی پیش و پس آزمون، و مقایسهٔ پس آزمون آب و خشكي از آناليز واريانس يكسويه استفاده شد (p≤٠/٠٥).

پس از فعالیت هوازی (آب و خشکی) در مقایسه با پیش، مقادیر توان انفجاری (p=٠/٠٠١)، چابکی (p=٠/٠٠١) و تعادل ایستا (p=٠/٠٠٣)، بهبود معنی داری یافت، با مقایسهٔ تمرین در آب و خشكي، تفاوت معناداري مشاهده نشد (p>٠/٠٥).

به نظر میرسد که شش هفته فعالیت هوازی در آب و خشکی بر توان انفجاری، چابکی و تعادل ايستا مؤثر، اما بر سرعت عكس العمل مؤثر نباشد، و بين اين دو محيط تفاوتي وجود ندارد.

#### **Extended Abstract**

According to the two general goals of physical fitness, physical fitness factors are classified into two categories: health-related factors and skill-related factors, and after that, skill-related physical fitness is divided into six categories (agility, balance, coordination, power, speed, and reaction time). These factors are capabilities that help a person in the optimal implementation of sports activities (1). In line with the above physical fitness factors, explosive power and speed along with high agility are considered key and important factors in sports activities, and compared to other physical fitness factors, they have more effects in improving the performance of speed and strength athletes (2). Among the other most important factors of physical fitness related to sports performances is agility, which causes better performance in performing sports skills and less injury in athletes (1). Agility skill is more influenced by strength, reaction, maintaining balance and coordination (6), and usually athletes who have good speed, power, and strength have more agility ability (2). The ability to maintain the stability or balance of the body in a fixed position is called static balance. It has been proven that the force of buoyancy in water works against gravity, and it can act as an auxiliary, resistance or support force (12). Reaction time or reaction time is the time interval from the moment a stimulus enters or the signal arrives in an unexpected and sudden way, until the time the response to that stimulus starts, in fact, this data is a very sensitive and objective parameter and represents motor and cognitive performance, and having a short reaction time is very important and increases sports skills (7). The final goal of most different sports exercises is to expand the strength of athletes, or in other words, to increase the speed of force production, which requires increasing the amount of force produced by the muscles and also reducing the amount of time required to produce force (14). Due to the fact that the resistance force of water is greater than that of air and most movements are performed in water with greater resistance, it may have a greater effect on increasing muscle power (9). In a study, it was stated that due to the higher viscosity of water than air, most of the movements in water take place with greater resistance (16). Also, more specifically, other researches in the field of swimming and plyometric exercises in water and on land have shown that the implementation of sports exercises in water improves the start of swimming, swimming record of breaststroke and backstroke, and the muscular strength of swimmers (15). Considering that the improvement of

anaerobic or explosive power is directly related to the improvement of strength and speed (15), therefore, knowing what training environment improves explosive power and other skill-related factors is essential, and whether it is better to perform exercises in water or on land, is a challenging issue.

### Methodology

Thirty non-athletic girls (18-25 years old) were randomly divided into two groups of 15 people: water and land. The subjects performed aerobic activity for six weeks, 3 sessions per week, and 45 to 60 minutes per session with 60 to 70% of maximum heart rate. On even days of the land group and odd days of the water group, the subjects did aerobic activity at 19:00. In each training session, the subjects ran calmly for 5 minutes, then 5 minutes of stretching, the next 35 to 40 minutes, aerobic activity (aerobic movements) with 60 to 70% of the maximum heart rate, and the last 5 minutes. Back to the initial state was implemented.

Before and after aerobic activity, their explosive power using the vertical jump (Sargent), agility by 4×9 test, reaction by reaction time test, and the balance by static balance test was calculated. For compare pre- and post-test, and to compare post-test results in water and land, One-way ANOVA with p<0.05 was used. Statistical testing was performed by SPSS version 20, and the graph were drawn by Excel 2013.

### **Findings**

When comparing the results of the explosive power test, by the statistical method of one-way analysis of variance, it was found that the subjects of the present study in both water and land training groups, compared to before the implementation of six weeks of aerobic training, had a significant increase in the maximum had their explosive power (p=0.001). While the comparison of training groups in water and on land did not show a significant difference in maximum explosive power (p=0.23) (Table1) (Fig2). The results before and after performing six weeks of aerobic activity in both water and land environments, a significant difference were observed in agility values (p=0.001), and static balance (p=0.001), but when compared, was no significant difference between the training groups in water and land (Table1) (Fig 2&3). After comparing the training groups with six weeks of aerobic activity, and also comparing between the water and land environments, no significant difference was observed in the reaction speed values (p=0.06) (Table1) (Fig2).

### **Discussion**

The results of the present study showed that the explosive power values of nonathletic girls increased significantly after performing six weeks of aerobic activity in both water and land training groups, while not observed a difference between exercise activities in both water and land environments. The results of the research stated that due to the greater stickiness of water compared to air, the performance of movements (introverted and extroverted) is performed with greater resistance, although it is possible that due to buoyancy and reduced pressure on the joints, resistance Water should also be adjusted (16). According to these findings, it seems that the increase in the explosive power values of inactive girls in the water environment is due to the higher hydrostatic pressure of the water, and in the land environment due to the increase in the pressure of gravity on the muscles and joints. After six weeks of aerobic training in both water and land environments, a significant improvement was observed in the girls' agility record, and there was a greater numerical improvement in the land training group, which was not statistically significant. In fact, explosive power and speed along with high agility are considered key factors in exercise activities (2), and it seems that the greater resistance of the aquatic environment, and the increase in coordination and integration of movement units, the improvement of this component has been effective (16). The results of the studies stated that water, due to its physical advantages, is one of the suitable alternative methods for improving balance control, and also the auxiliary factors of hydrostatic pressure and buoyancy in water, allow training in the water environment compared to The land environment is more effective. Researchers stated that exercises that increase the strength of lower limb muscles can be more effective on static or dynamic balance. Researchers stated that exercises that increase the strength of lower limb muscles can be more effective on static or dynamic balance. Increasing the coordination and integration of movement units, as well as increasing the inhibition of opposing muscles, which ultimately improves neuromuscular responses, and in this way can improve the level of balance (9). Due to the fact that there is no static resting position in the water, therefore the muscles are constantly active to stabilize the body positions, so it is possible that this problem of stabilizing the positions allows the person exercising in the water to gain strength, flexibility- Acceptability and most importantly improve the balance. Also, due to its higher viscosity, water has more resistance than air, so it increases the sensory

feedback and increases the sense of physical awareness. Exercising in water may provide conditions to challenge the balance system by stimulating the senses involved in balance and thus be effective in improving people's balance (18). Appropriate and quick reaction to the auditory stimulus is very important, especially in sports competitions, and it has been stated that this component is affected by physical fitness, as well as people who have a stronger neuro-muscular system, photo speed They have a higher function (4). Therefore, in any type of sport and activity where a person needs a quick and correct reaction to make a decision and execute a suitable movement, improving prediction skills and reaction time can help in improving movement control. In general, it seems that the implementation of aerobic activity in the water environment is capable of improving the components of explosive power, agility and static balance, while it does not have a significant effect on the reaction speed.

Keywords: Motor fitness, Water, Land

### مقدمه

آمادگی جسمانی شامل توانایی انجام فعالیتهای روزانه با قدرت، هوشیاری، بدون خستگی و با انرژی فراوان، و نیز توانایی روبهروشدن با موارد اضطراری پیشبینی نشده است باتوجهبه دو هدف کلی آمادگی جسمانی، عوامل آمادگی جسمانی به دوطبقه عوامل وابسته به تندرستی، و عوامل وابسته به مهارت طبقهبندی شده است، و پس از آن، آمادگی جسمانی وابسته به مهارت را شش بخش (چابکی، تعادل، هماهنگی، توان، سرعت، و زمان عکسالعمل) تشکیل می دهد. این عوامل قابلیتهایی هستند که فرد را در اجرای بهینه فعالیتهای ورزشی کمک میکنند (۱). در راستای عوامل آمادگی جسمانی فوق، توان انفجاری و سرعت همراه با توانایی چابکی بالا، از عوامل کلیدی و مهمی در فعالیتهای ورزشی محسوب می شوند، و نسبت به دیگر فاکتورهای آمادگی جسمانی تأثیرات بیشتری در جهت بهبود عملکرد ورزشکاران سرعتی و توانی دارند (۲).

در تحقیقات مارتل (۲۰۰۵) و جاکوبسن (۲۰۰۷)، که تاثیر تمرینات پلایومتریک در آب و خشکی را بر روی زنان انجام دادند، از پرش عمودی به عنوان یکی از ابزارهای اندازه گیری توان استفاده شد. نتایج این مطالعات، به افزایش معنی داری در توان عضلانی پس از ۸ هفته برنامه تمرینی پلایومتریک اشاره داشتند (۲٫۳ ٤). در پژوهش دیگری پس از بررسی اثر هشت هفته تمرینات پلایومتریک بر توان انفجاری دختران شناگر، تفاوت معناداری در هر سه گروه (تمرین در خشکی، در آب، و در خشکی و آب) در مقایسه با گروه کنترل مشاهده گردید (۵).

از دیگر مهمترین عوامل آمادگی جسمانی وابسته به اجراهای ورزشی، چابکی است که باعث عملکرد بهتر در اجرای مهارتهای ورزرشی و آسیب کمتر در ورزشکاران میشود (۱). مهارت چابکی بیشتر تحت تأثیر قدرت، عکسالعمل، حفظ تعادل و هماهنگی است (٦)، و بهطور معمول ورزشکارانی که سرعت، توان، و نیروی خوبی داشته باشند از قابلیت و توانایی چابکی بیشتری برخوردار هستند (۲). گزارش شده است که هشت هفته تمرینات ورزشی منجر به بهبود چابکی پسران (۱۹ساله) و دختران (۱۳ ساله) فوتبالیست می گردد (۷). یافتههای مطالعه ماتیسن و پیترسن (۲۰۱۵) نیز، نشان داد که هشت هفته تمرینات با شدت بالا منجر به بهبود چابکی پسران فوتبالیست (۱۰ ساله) می گردد (۸). یک مطالعه دیگر به بررسی تأثیر شش هفته تمرینات پلایومتریک در آب و خشکی بر توان انفجاری، چابکی در پسران دانشجو پرداخت، که اختلاف معنی داری در توان انفجاری و چابکی بین دو محیط مشاهده نشد (۹). همچنین، نتایج مطالعات جاکوبسن (۲۰۰۷) به این اشاره داشت که شش هفته تمرین پلایومتریک در آب و خشکی، به طور افز ایش و چابکی را در مردان غیر ورزشکار توان انفجاري معنىدارى می دهد، اما تفاوتی در اجرای دو گروه تمرین کرده در آب و خشکی وجود نداشت (٤). نتایج مطالعه دیگری عنوان داشت که یس از اجرای تمرینات پلایومتریک بین سه گروه (کنترل، آب و خشکی) تفاوت معنی داری در توان انفجاری و چابکی مشاهده نشد. یافتههای مطالعه قاسمی و همکارانش (۱۳۹۳) عنوان داشت که اجرای هشت هفته تمرینات پلایومتریک (٤٠دقیقه و ۳ جلسه در هفته) توسط پسران نوجوان تکواندوکار، تأثیر معنادری در رکورد پرش عمودی و زمان تست چابکی داشت (۱۰). اجرای هشت هفته تمرینات آمادهسازی در دختران جوان تکواندوکار، منجر به بهبود معنی دار پرش عمودی گردید، اما رکوردهای مربوط به چابکی و سرعت عکسالعمل تغییر معنی داری نداشت، که ممکن است به دلیل آمادگی جسمانی بالای آزمودنی ها باشد (۱۱).

توانایی حفظ پایداری یا توازن بدن، در وضعیت ثابت را تعادل ایستا می گویند. ثابت شده است که نیروی شناوری در آب، مخالف جاذبه عمل می کند، و می تواند به عنوان یک نیروی کمکی، مقاومتی یا حمایتی عمل کند. هم چنین فشار هیدرواستاتیک در زمان غوطهوری در آب، مقاومت برابری بر تمام گروههای عضلانی فعال اعمال می کند، از اینرو نوعی شرایط تمرینی مقاومتی ایجاد می کند، و همچنین حس قوی از ثبات را تأمین می کند. مطالعات زیادی تأثیر تمرینات در محیط آب را بر تعادل ایستا (خصوصاً سالمندان) بیان داشته اند. دوریس (۲۰۰۳) تفاوت معناداری در تعادل سالمندان پس از تمرینات هوازی در آب مشاهده نکردند (۱۲)، در حالی که جواهری (۱۳۸۸) اعلام داشت که اجرای هشت هفته تمرین هوازی در آب، بر تعادل ایستا و پویای زنان سالمند مؤثر است (۱۳).

زمان واکنش یا زمان عکسالعمل، فاصله زمانی از لحظه وارد آمدن یک محرک یا رسیدن سیگنال به صورت غیر پیش بینی شده و ناگهانی، تا زمان شروع پاسخ به آن محرک می،باشد، در واقع این داده، پارامتری بسیار حساس و عینی است، و نمایانگر عملکرد حرکتی و شناختی میباشد، و داشتن زمان عکسالعمل کوتاه بسیار حائز اهمیت بوده و باعث افزایش مهارت ورزشی می گردد. بنابراین یکی از معیارهای مهم در ارزیابی سلامت ذهنی و حرکتی هر فرد، تخمين صحيح سرعت عكس العمل و مهارت، پيش بيني او نسبت به عوامل محرك بيروني است (٧). نتايج يك مطالعه نشان داد که شش هفته تمرینات ورزشی منتخب (٤٥ دقیقه و سه جلسه در هفته) با بهبود معنی دار چابکی در دختران دانش اموز ابتدایی همراه بود اما اثر معنیداری بر بهبود توان و عکسالعمل دختران دانش اموز ابتدایی نداشت (۱). هدف نهایی اکثر تمرینات مختلف ورزشی، گسترش توان ورزشکاران، یا به عبارت دیگر افزایش در سرعت تولید نیرو است، که لازمه ان افزایش مقدار نیروی تولیدی از سوی عضلات و نیز کاهش مقدار زمان لازم برای تولید نیرو است (۱٤). به دلیل اینکه نیروی مقاومت آب از هوا بیشتر است، و عمده حرکات در آب با مقاومت بیشتری اجرا می گردد، ممکن است بر افزایش توان عضلانی تأثیر بیشتری داشته باشد (۹). با توجه به اینکه بهبود توان بی هوازی یا انفجاری با ارتقاء قدرت و سرعت ارتباط مستقیم دارد (۱۵)، لذا دانستن این موضوع که چه محیط تمرینی باعث بهبود توان انفجاری و دیگر عوامل وابسته به مهارت میشود، ضروری بهنظر میرسد، و اینکه اجرای تمرینات در آب یا خشکی بهتر است، موضوعی چالش برانگیز است. مطالعات زیادی که به بررسی اثرات تمرینات ورزشی در آب یر داختند، عنوان داشتند که با توجه به چسبندگی (ویسکوزیته) بیشتر آب از هوا، اکثر حرکات در آب با مقاومت بیشتری صورت میگیرد (۱۲). همچنین، به طور تخصصیتر، پژوهشهای دیگر نیز در زمینه شنا و تمرینهای پلیومتریک در آب و خشکی نشان داده است که اجرای تمرینات ورزشی در آب، باعث بهبود اجرای استارت شنا، رکورد شنای کرال سینه و پشت، و توان عضلانی شناگران شده است (۱۵). بر همین اساس، انتخاب نوع محیط تمرین میتواند تأثیرات متفاوتی بر عوامل فیزیولوژیکی و روانشناختی افراد داشته باشد، و بررسی اینکه کدام روش تمرینی اثر برجسته تری بر آمادگی جسمانی می تواند داشته باشد، انگیزهای برای اجرای پژوهش گردید. بنابراین، هدف از این مطالعه، مقایسه اثر شش هفته فعالیت هوازی در محیط آب و خشکی، بر عوامل آمادگی حرکتی دختران جوان غیر فعال بو د.

### روششناسي

### روش پژوهش

پژوهش حاضر از نوع کاربردی بالینی بود، و از نظر اجرا در مقطع زمانی، بهصورت مطالعه طولی اجرا گردید.

### آزمودنيها

نمونه آماری پژوهش حاضر، شامل ۳۰ نفر از دانشجویان دختر غیر ورزشکار دانشگاه علوم پایه دامغان در محدوده سنی ۱۸ تا ۲۵ سال بودند که حداقل طی ۲ سال گذشته هیچگونه فعالیت منظم ورزشی نداشتند. آزمودنی ها به طور تصادفی به دو گروه ۱۵ نفری جهت اجرای فعالیت ورزشی در آب و خشکی تقسیم شدند.

### برنامه تمرين

برنامه تمرینی در هر دو گروه آزمودنی، یک روز بعد از اجرای تست پیش آزمون تا یک روز قبل از اجرای پس آزمون، به طور مرتب و بدون تعطیلی طی ٦ هفته و هر هفته سه جلسه (۱۸ جلسه)، و هرجلسه به مدت ٦٠- ٤٥ دقیقه اجرا گردید، به طوری که روزهای زوج گروه خشکی و روزهای فرد گروه آب، در ساعت ۱۹به فعالیت هوازی می پرداختند. در هر جلسه تمرین، آزمودنی ها به مدت ٥ دقیقه آرام می دویدند، سپس ٥ دقیقه انجام حرکات کششی، ٣٥ تا ٤٠ دقیقه بعدی، فعالیت هوازی (حرکات ایروبیک) با ٦٠ تا ۷۰ درصد حداکثر ضربان قلب، و ٥ دقیقه آخر نیز برگشت به حالت اولیه اجرا می شد. در جلسه تمرین از موسیقی جهت انگیزه بیشتر در تمرینات استفاده گردید.

### آزمونها

برای سنجش قدرت انفجاری پاها از دستگاه Vertical Gump (ساخت شرکت ساتراپ) استفاده گردید. بدین صورت که آزمودنی ها پس از ایستادن در کنار حس گری که بر روی دیوار نصب شده است، ابتدا پس از شنیدن صدای بوق اول دستگاه، بدون پرش دست خود را بر روی حس گر قرار می دهند، و اندازه و ارتفاع قد آزمودنی ثبت می گردد. آزمودنی پس از شنیدن صدای بوق دوم پرش به سمت بالا (پرش عمودی) را انجام داده و با دست به حس گر ضربه می زند، و ارتفاع پرش ثبت می گردد این کار سه بار پی درپی تکرار شده، و از سه پرش، پرشی که بیشتر باشد به عنوان رکورد نهایی بر حسب سانتی متر ثبت می گردد.

به منظور سنجش تست چابکی از دستگاه Agility استفاده گردید. این دستگاه دارای دو سنسور است که در دو طرف به فاصله نه متری قرار دارد. این دستگاه مجهز به یک چشم الکترونیکی است که در ابتدای خط شروع قرار دارد که وظیفه آن نشان دادن زمان شروع و پایان حرکت است، رکورد توسط صفحه مانیتور دستگاه ثبت می گردد. به این ترتیب آزمودنی پس از قرار گرفتن در پشت خط شروع قرار گرفته و پس از شنیدن صدای بوق دستگاه، به طرف مقابل حرکت کرده و سنسور انتهای خط را لمس کرده و بر می گردد و سنسور دوم را نیز لمس کرده مجدداً به سمت سنسور اول رفته و در برگشت از خط عبور می کند و رکورد توسط دستگاه ثبت می گردد.

جهت سنجش سرعت عکسالعمل، از دستگاه Reaction time test استفاده گردید. این دستگاه دارای یک تشک مربعی شکل سنسور دار است که از عدد ۱ تا ۹ روی آن مندرج شده است، و نیز یک صفحه مانیتور که اعداد را برای آزمودنی مشخص می نماید. آزمودنی بر روی وسط تشک دارای سنسور قرارمی گیردد، و با صدای بوق دستگاه و با

نگاه کردن به صفحه مانیتور شروع به پریدن روی اعداد مورد نظر میکند، سپس با اتمام برنامه، زمان واکنش آزمودنی توسط دستگاه مشخص ثبت میگردد.

برای سنجش تعادل ایستا از دستگاه Static balance استفاده گردید. این دستگاه مجهز به یک صفحه متحرک است که آزمودنی بر روی آن قرار می گیرد. در ابتدا آزمودنی برای مستقر شدن بر روی صفحه دستگیره تعبیه شده را می چسبد، اما پس از سبزشدن چراغ دستگاه، آن را رها می کند، و از همین زمان دستگاه تعداد خطاها و انحراف به سمت راست و چپ آزمودنی را ثبت می کند. این تست دو بار انجام می گیرد و بهترین رکورد ثبت می گردد.

### روش آماري

در این تحقیق از روشهای آمار توصیفی (میانگین و انحراف استاندارد) جهت جداول و نمودارها، و برای نشاندادن اثر معنی داری از آمار استنباطی استفاده شد. در صورت ناپارامتریک بودن داده ها از آزمون ویلکاکسون برای بررسی تأثیر هر یک از روشهای تمرینی بر متغیرهای موردنظر در پیش آزمون و پس آزمون استفاده گردید. جهت بررسی تغییرات پیشوپس آزمون، و تغییرات بین گروهی تحلیل واریانس یکسویه بکار گرفته شد. تمامی محاسبات با استفاده از نرم افزار کامپیوتری SPSS نسخه ۲۰، و در سطح آلفای کمتر یا مساوی ۲۰،۰ بررسی گردید، و نمودارها با استفاده از نرم افزار Excel 2023 رسم گردیدند.


### ىافتەھا

هنگام مقایسهٔ نتایج آزمون توان انفجاری، توسط روش آماری تحلیل واریانس یکسویه، مشخص شد که آزمودنی های پژوهش حاضر در هر دو گروه تمرین در آب و خشکی، در مقایسه با پیش از اجرای شش هفته تمرین هوازی، افزایش معناداری در حداکثر توان انفجاری خود داشتند ( $p=\cdot/\cdot\cdot\cdot$ ) (جدول ۱) (شکل ۱). در حالی که مقایسه ی گروه های تمرینی در آب و خشکی، تفاوت معناداری را در حداکثر توان انفجاری، نشان نداد ( $p=\cdot/\cdot\cdot$ ) (جدول ۱) (شکل ۲). نتایج پیشوپس از اجرای شش هفته فعالیت هوازی در هر دو محیط آب و خشکی، تفاوت معنی داری در مقادیر چابکی ( $p=\cdot/\cdot\cdot$ )، و تعادل ایستا ( $p=\cdot/\cdot\cdot$ ) مشاهده گردید، اما هنگام مقایسهٔ گروههای تمرینی در آب و خشکی، تفاوت معناداری وجود نداشت (جدول ۱) (شکل ۲و۳).


پس از مقایسه گروههای تمرینی با پیش از اجرای شش هفته فعالیت هوازی، و نیز مقایسه بین دو محیط آب و خشکی، تفاوت معنی داری در مقادیر سرعت عکس العمل، مشاهده نگر دید (p=٠/٠٦) (جدول ۱) (شکل ۲).

جدول شماره ۱. مقایسه مقادیر آمادگی جسمانی (میانگین + انحراف معیار) پیش و پس از شش هفته فعالیت هوازی در آب و خشکی، \*: تفاوت معنی دار پیش و پس آزمون

معنی داری مقایسه	درصد تغییر و معنی	پسآزمون	پیشآزمون	مكان	آزمون
آب و خشکی	داری				
•/٢٣	*۱۰۰۱؛ و ۸/٤٪	744 + 14/49	77A/7 ± 17/V0	آب	توان انفجاری
	*۱۰۰۱،و ۵/۸٦٪	YYV/AV ± A/0V	777 ± 9/7A	خشكى	(سانت <i>ى</i> متر)
•/٧٣	* ۰/۰۰۱ و ۹۳۰٪	1 • / 0 × ± • / 7.۸ V	11/01 ± •/071	آب	چابکی
	* ۰/۰۱٪	1 • / A A ± • / V Y V	11/91 ± •/98	خشكى	(ثانیه)
•/٧٨	۰/۰٦ و ۰/۰۶٪	9/17 ± 7/77	9/17 ± 7/21	آب	سرعت عكسالعمل
	۰/۰٦ و ۰/۰۸٪	9/VY ± 1/V7	1./T ± 1/m	خشكى	(ثانیه)
•/00	***۰/۰و ۱۰٪	97/TT ± E/91	17/mm + 15/95	آب	تعادل ايستا
	***۰/٠٠و ۲۲/۷٪	9 E/AV ± V/YT	AV/Y ± AY/11	خشكى	(ثانیه)




شکل شماره ۱. مقایسه توان انفجاری (میانگین + انحراف معیار) پیش و پس از شش هفته فعالیت هوازی در آب و خشکی (سانتی متر) \*: ۱-۰-۱۰\*



شکل شماره ۲. مقایسه چابکی و سرعت عکسالعمل (میانگین +انحراف معیار) پیش و پس از شش هفته فعالیت هوازی در آب و خشکی (ثانیه)

p=•/•• :\*



شکل شماره ۳. مقایسه تعادل ایستا (میانگین + انحراف معیار) پیش و پس از شش هفته فعالیت هوازی در آب و خشکی (ثانیه) \*: ۱-۰-۱۰\*

#### بحت

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مقادیر توان انفجاری دختران غیرورزشکار، پس از اجرای شش هفته فعالیت هوازی، در هر دو گروه تمرینی آب و خشکی افزایش معنی داری داشته است، در حالی که بین فعالیت ورزشی در دو محیط آب و خشکی، تفاوتی مشاهده نشد. یکی از اصول مهم و ضروری آمادگی جسمانی، داشتن سرعت زیاد، توان و قدرت انفجاری مناسب است (۱٤). داشتن توان انفجاری بالا نیز در بسیاری از ورزشهای انفرادی و گروهی که نیازمند جهش و پرشهای متعددی هستند، بسیار مؤثر و سودمند خواهد بود (۱٤). نتایج تحقیقات، بیان داشتند که به دلیل چسبندگی بیشتر آب در مقایسه با هوا، اجرای حرکات (درونگرا و برونگرا)، با مقاومت بیشتری انجام می گیرد، هر چند ممکن است به دلیل شناوری و کاهش فشار به مفاصل، مقاومت آب نیز تعدیل گردد (۱۲). با توجه به این یافتهها، به نظر می رسد که افزایش مقادیر توان انفجاری دختران

غیرفعال، در محیط آب، در نتیجه فشار هیدرواستاتیک بیشتر آب، و در محیط خشکی به دلیل افزایش فشار جاذبه بر عضلات و مفاصل باشد. قابل ذکر است که هر چند میزان توان انفجاری دختران، پس از شش هفته فعالیت هوازی در محیط آب، در مقایسه با خشکی، به میزان ۹/۱۳ سانتی متر افزایش داشت، اما این مقدار از لحاظ آماری معنی دار نبود. در همین راستا شافر (۲۰۰۷)، جاکوبسن (۲۰۰۷) و رابینسون (۲۰۰۷)، هنگام مقایسه محیط آب و خشکی، تفاوت معناداری را در توان انفجاری مشاهده نکردند، اما در هر دو گروه تمرینی در مقایسه با گروه کنترل، افزایش وجود داشت (۶, ۹, ۱۷). در مقابل با یافتههای پژوهش حاضر، نتایج مارتل (۲۰۰۵) و رابینسون (۲۰۰۵) حاکی از افزایش معنادار توان انفجاری زنان ورزشکار در محیط آب، در مقایسه با تمرین در خشکی بود، که ممکن است به دلیل شدت بیشتر تمرینات و به دنبال آن، مقاومت بیشتر آب در مقایسه با خشکی باشد (۳, ۱۷).

پس از شش هفته تمرینات هوازی در هر دو محیط آب و خشکی، بهبود معناداری در رکورد چابکی دختران مشاهده شد، و نیز بهبود عددی بیشتری در گروه تمرین در خشکی وجود داشت، که به لحاظ آماری معنی دار نبود. همسو با این نتایج، مطالعه شافر و جاکوبسن (۲۰۰۷) بیان داشتند که پس از اجرای شش هفته تمرینات پلایومتریک، مقادیر چابکی بین گروههای تمرین در آب و خشکی تفاوت معنی داری وجود ندارد (٤, ۹). در مطالعه جوزف (۲۰۰۷) بهبود معناداری در میزان چابکی گروه تمرین در آب ملاحظه نمود (۹). همچنین قاسمی (۱۳۹۳) و ناصرپور تمرین در خشکی، در مقایسه با گروههای کنترل و تمرین در آب ملاحظه نمود (۹). همچنین قاسمی (۱۳۹۳) و ناصرپور (۱۳۹۳)، عنوان کردند که اجرای هشت هفته فعالیت هوازی در پسران جوان، منجر به بهبود رکورد چابکی آنان می گردد (۱۰, ۱۳۹۳)، در واقع، توان انفجاری و سرعت همراه با توانایی چابکی بالا از عوامل کلیدی در فعالیتهای ورزشی محسوب می شوند (۲)، و بهنظر می رسد که مقاومت بیشتر محیط آبی، و افزایش هماهنگی و یکپارچگی واحدهای حرکتی، بر ارتقا این مولفه مؤثر واقع شده باشند (۱۳).

پس از بررسی نتایج مشاهده شد که هر دو گروه تمرین در آب و خشکی، افزایش معناداری در زمان تعادل ایستا داشتند. که با نتایج دوریس (۲۰۰۳) مخالف، و با نتایج جواهری (۱۳۸۸) موافق بود (۱۲٫۳)، البته که هردوی این مطالعات، نتایج هشت هفته فعالیت هوازی برروی افراد سالمند بودند. همچنین این مؤلفه، در گروه تمرین در آب بیشتر بود اما از نظر آماری معنی دار نبود، که بر خلاف یافتههای محمدزاده (۱۳۹۳) بود که بیان داشت که تفاوت معنی داری در تعادل چشم بسته بین گروه خشکی و آب وجود دارد (۱۸). نتایج مطالعات عنوان داشتند که آب، به دلیل مزایای فیزیکی، یکی از روشهای جایگزین مناسب برای بهبود کنترل تعادل می باشد، و نیز عوامل کمک کننده فشار هیدرواستاتیک و شناوری در آب، اجازه می دهد تا تمرین در محیط آبی نسبت به محیط خشکی موثر تر باشد. پژوهش گران بیان داشتند که تمریناتی که منجر به افزایش قدرت عضلات محیط آبی نسبت به محیط خشکی موثر تر باشد. پژوهش گران بیان داشتند که تمریناتی که منجر به افزایش قدرت عضلات و نیز افزایش بازدارندگی عضلات مخالف می باشد که در نهایت باعث بهبود پاسخهای عصبی - عضلانی شده، و از این طریق می تواند میزان تعادل را بهبود بخشد (۹). با توجه به این که در آب هیچ وضعیت استراحتی ایستایی وجود ندارد، بنابراین عیس کننده در آب اجازه کسب قدرت، انعطاف پذیری و از همه مهم تر بهبود تعادل را بدهد. همچنین آب نسبت به هوا به تمرین کننده در آب اجازه کسب قدرت، انعطاف پذیری و از همه مهم تر بهبود تعادل را بدهد. همچنین آب نسبت به هوا به علت خاصیت ویسکوزیته بیشتر دارای مقاومت بیشتری است، از این رو بازخورد حسی را افزایش داده و باعث بالا رفتن علت خاصیت ویسکوزیته بیشتر دارای مقاومت بیشتری است، از این رو بازخورد حسی را افزایش داده و باعث بالا رفتن

بیشتر حس آگاهی بدنی میگردد. تمرین در آب ممکن است با تحریک حواس درگیر در تعادل، شرایطی برای به چالش کشیدن دستگاه تعادل فراهم آورده و از این طریق در بهبود تعادل افراد مؤثر باشد (۱۸).

پس از اجرای شش هفته تمرینات هوازی، بین گروههای تمرین در آب و خشکی، تفاوت معنی داری در میزان سرعت عکس العمل وجود نداشت. برخلاف با این نتایج، حسینی اعلام داشت که اجرای شش هفته فعالیت هوازی، منجر به بهبود معنی دار سرعت عکس العمل دختران می گردد (۱٤). واکنش مناسب و سریع به محرک شنیداری، خصوصا در مسابقات ورزشی، بسیار حائز اهمیت می باشد، و عنوان شده است که این مؤلفه تحت تاثیر آمادگی جسمانی قرار می گیرد، و نیز افرادی که دارای سیستم عصبی عضلانی قوی تری هستند، سرعت عکس العمل بالاتری دارند (۱٤). لذا در هر نوع ورزش و فعالیتی که فرد نیازمند عکس العمل سریع و صحیح جهت تصمیم گیری و اجرای یک حرکت مناسب باشد، ارتقاء مهارتهای پیش بینی و زمان عکس العمل می تواند در بهبود کنترل حرکتی کمککننده باشند. بر همین اساس به نظر می رسد که شدت تمرینات هوازی در هر دو محیط آب و خشکی، در ارتقای هماهنگی عصبی حضلانی مؤثر نیست، و در مقادیر معناداری آماری، بر کاهش سرعت عکس العمل نیز مؤثر نبوده است.

### نتيجهگيري

در مجموع به نظر می رسد که اجرای فعالیت هوازی در محیط آب، قادر به بهبود مؤلفه های توان انفجاری، چابکی و تعادل ایستا است، در حالی که بر سرعت عکس العمل تأثیر معناداری ندارد. در پایان، پیشنهاد می شود که نتایج مقادیر مربوط به توان انفجاری، چابکی، سرعت عکس العمل و تعادل ایستا، در دختران جوان با مقادیر پسران جوان نیز مقایسه گردد، تا مشخص شود که آیا این مقادیر علاوه بر محیط آب و خشکی، تحت تأثیر جنسیت نیز قرار دارند یا خیر.

### References

- Hosseini SA, Mosavi MS, Ahmadi M, Shadmehri S. The Effect of Selected Exercise Trainings on Skill-Related Physical Fitness Factors in Elementary School Girl Students. 2019. DOI: 10.21859/ijrn-050410
- Jafari Moghadam S, Aminai M, Marefati HJJoSB. A Comparison of the Acute Effects of Voluntary Contractions at Different Intensities and Times on Explosive Power, Sprint and Agility in Football Players. 2016;8(1):35-49. DOI:10.22059/jsb.2016.58233
- Martel GF, Harmer ML, Logan JM, Parker CBJM, sports si, exercise. Aquatic plyometric training increases vertical jump in female volleyball players. 2005;37(10):1814-9. DOI: 10.1249/01.mss.0000184289.87574.60.
- 4. Stemm JD, Jacobson BHJTJoS, Research C. Comparison of land-and aquatic-based plyometric training on vertical jump performance. 2007;21(2):568-71. DOI: 10.1519/R-20025.1
- 5. Stratman JA. Differences in training programs and time trial performances of teenage sprint freestyle swimmers: Eastern Kentucky University; 2013. https://encompass.eku.edu/etd/136
- 6. Abolhassannezhad M, Alizadeh M, Bayat M, Sharifzadeh GJJoBUoMS. Comparison of agility, speed, and power level between male junior high school students having normal/abnormal toeout in Birjand in 2007. 2009;16(4):32-7. http://journal.bums.ac.ir/article-1-529-en.html
- 7. Amiri S, Shadmehr A, Ashnagar Z, Jalaie SJMR. Design and construction of a system for reaction time test and anticipation skill estimation. 2012;6(2). DOI:10.7763/IJBBB.2012.V2.148
- 8. Mathisen G, Pettersen SJTJoSM, Fitness P. Effect of high-intensity training on speed and agility performance in 10-year-old soccer players. 2015;55(1-2):25-9. DOI:10.53350/pjmhs22161582
- Shaffer JD. The effects of a six-week land-based and aquatic-based plyometric training program on power, peak torque, agility, and muscle soreness: West Virginia University; 2007.DOI: 10.48308/joeppa.2010.98584
- 10. Ghasemi GH, Marandi M, Rahimi N, Bokrani A. Comparison of common taekwondo and plyometric exercises on vertical jump, agility and speed of taekwondo teenagers. Journal of Applied Sports Physiology. 2015. **10**(20): 35-46. DOI:10.46827/ejpe.v7i5.4089
- 11. Naserpour H, Mimar R, Khoshjamal Fekri SJJoSB. The Effect of Eight-Weeks General Preparation Exercise on Some Selected Biomechanical, Anthropometrical and Physiological Parameters of the Iranian Women's National Taekwondo Team. 2017;3(3):49-56. DOI: 10.32598/SJRM.12.3.9.
- 12. Douris P, Southard V, Varga C, Schauss W, Gennaro C, Reiss AJJoGPT. The effect of land and aquatic exercise on balance scores in older adults. 2003;26(1):3-6.DOI: 10.32598/irj.19.4.1166.1
- 13. Hashemi-javaheri ÅA, Mohamad-rahimi N, Ebrahimi-Atri A. The effect of water exercise on the balance of older men. Sports Medicine Studies. 2010. **8**(2): 44-133. DOI: 10.21859/sija.12.3.384
- 14. Robinson, L.E., et al., The effects of land vs. aquatic plyometrics on power, torque, velocity, and muscle soreness in women. 2004. 18(1): p. 84-91. DOI: 10.1519/1533-4287(2004)018<0084:teolva>2.0.co;2.
- 15. Mohamadi R, Sadeghi H, Barati AHJRiSM, Technology. Effect of Aquatic and Land-base Plyometric Exercise on Selected Biomechanical Parameters of Butterfly Swimming in Elite Male Adolescent Swimmers10-14 years. 2015;13(9):13-22.DOI: 10.18869/acadpub.jsmt.13.9.13
- 16. Federation ID, Atlas IJIda, 6th edn Brussels, Belgium: International Diabetes Federation. International Diabetes Federation. 2013. DOI: 10.1016/j.diabres.2019.107843.
- 17. Robinson LE, Devor ST, Merrick MA, Buckworth JJTJoS, Research C. The effects of land vs. aquatic plyometrics on power, torque, velocity, and muscle soreness in women. 2004;18(1):84-91. DOI:10.1519/1533-4287(2004)018<0084:TEOLVA>2.0.CO;2
- 18. Mohammadzadeh M, Ashtari M, Rarnama NJJoRiRS. Comparison of effects of two type physical activity in water on the health related factors in old women (60-75 years). 2014;10(4):559-68.DOI: 10.22122/jrrs.v10i4.1557